

POSE DE FILS DE REDENSIFICATION RESORBABLES

DEVIS ET CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

Date de la première consultation concernant l'intervention évoquée ci-dessous :

Il est prévu que soit réalisée, par le Dr.....
titulaire de la qualification et de la compétence en.....
reconnue officiellement par le Conseil de l'Ordre des Médecins,
Conseil Départemental auprès duquel il est inscrit sous le numéro
et garanti pour cet acte en responsabilité civile professionnelle par.....

Au bénéfice de

Mme, Melle, Mr

Né(e) le

Demeurant.....

À la date du

Une intervention de type : Correction de l'affaissement et relâchement du visage
par fils de type.....PDO ULTRA V, sous anesthésie locale.

Les informations d'ordre médical concernant cet acte et ses suites ont été exposées oralement
et par écrit dans une fiche d'information ci-jointe.

CONSENTEMENT :

Cette fiche d'information a été conçue comme un complément à votre première consultation, pour tenter de vous informer et répondre aux questions que vous pouvez vous poser si vous envisagez d'avoir recours à la mise en place de fils tenseurs de réjuvenation. Le but de ce document est de vous apporter tous les éléments d'information nécessaires et indispensables pour vous permettre de prendre votre décision en parfaite connaissance de cause.

Aussi vous est-il conseillé de le lire avec la plus grande attention.

DÉFINITION

Face à la demande croissante de techniques douces non chirurgicales visant à lutter contre les effets du vieillissement, en alternative à la chirurgie, pour la retarder ou en complément, des techniques visant à raffermir et harmoniser l'aspect des tissus superficiels, de la peau aux composants cutanés, ont considérablement évolué ces dernières années et leur utilisation est devenue de plus en plus aboutie autant que populaire. Les fils tenseurs appartiennent à la classe des dispositifs médicaux injectables, leur mise en place ne nécessitant qu'une effraction cutanée minimale. Il est important d'en comprendre l'intérêt unique comme les limites propres.

PRESENTATION ET TECHNOLOGIE

Les fils de redensification résorbables sont des dispositifs médicaux insérés via de minimes incisions et ancrés dans les espaces sous-cutanées. Leur composition induit une stimulation naturelle de collagène qui induit un raffermissement cutané guidé par cet ancrage avec un effet d'harmonisation des contours. Cette technique répond à l'excès de laxité superficielle et donc les excès d'affaissement graisseux éventuels répondront de manière plus négligeable à ce traitement. Les fils utilisés sont résorbables et il est donc nécessaire de renouveler l'opération après une certaine période pour maintenir l'effet, même si un effet préventif associé peut limiter ce besoin.

Fils proposés : PDO ULTRA V

Composition : POLYDIAXANONE

OBJECTIFS

L'objectif est de traiter le relâchement des différentes régions du visage et d'en harmoniser les contours. Le résultat visé est donc strictement correctif et naturel. Les régions classiquement traitées sont la pommette, les sillons nasogéniens, les bajoues et la commissure des lèvres, l'ovale du visage et le sourcil.

La séance peut être réalisée isolément, mais peut aussi compléter des techniques médicochirurgicales de rajeunissement plus radicales telles que resurfaçages (peeling, laser, dermabrasion), blépharoplasties (paupières), autre chirurgie, injections de redensification profonde ou de volumation, ultrasons focalisés, injections de toxine botulique pour corriger les excès musculaires hypertoniques à l'origine de certains plis et rides ...

Habituellement, les corrections atténueront considérablement les dysharmonies, sans les corriger complètement. Certaines régions répondent d'ailleurs beaucoup mieux au traitement que d'autres. De même, la pérennité de la correction est extrêmement variable selon les patient(e)s et la correction n'est que temporaire et le traitement devra être renouvelé pour entretenir le résultat, même si leur effet préventif peut atténuer considérablement ces rechutes.

Il faut noter que de nombreuses autres altérations peuvent être présentes, mais leur traitement n'est possible qu'en utilisant des techniques médico-chirurgicales différentes et complémentaires aux fils. Il en est ainsi en particulier des excédents cutanés importants qui ne pourront être corrigés que chirurgicalement. De même, certaines anomalies cutanées (aspérités, petites cicatrices, taches, micro-ridules, drapé cutané fripé) ne seront corrigées que par un resurfaçage propre (peeling, laser, dermabrasion).

Il n'existe pas de limites d'âge, au-delà de l'âge légal, pour la mise en place des fils.

PRINCIPES

Le principe de base est la mise en place précise d'un système de fils de redensification dans l'espace sous-cutané afin de créer une remise en tension des tissus. Le dispositif bénéficie du Marquage CE (Communauté Européenne) qui garantit l'agrément des autorités sanitaires européennes pour le produit utilisé.

AVANT LE TRAITEMENT

Un interrogatoire précis sera réalisé visant à rechercher d'éventuelles contre-indications à certains produits ou allergies, à déceler des éléments impliquant une attention particulière (exemple : herpès pour les infections labiales et péri-buccales, infections ou irritation de la peau), ou à préciser la nature d'éventuelles précédentes injections afin d'éviter certaines associations dangereuses de produits sur un même site. Il est capital de signaler au médecin tout antécédent ou condition et maladie active ainsi que les médicaments que vous êtes conduit à prendre. Un examen attentif est confronté à la demande et aux attentes du (de la) patient (e) afin de préciser ce qui est réalisable et ce qui est illusoire.

Les médicaments à base d'Aspirine ou d'anti-inflammatoire devront être évités dans les 3 jours précédant l'injection. Si vous prenez de l'aspirine en prévention de troubles cardio-vasculaire, il ne faut pas l'interrompre.

Il est préférable de ne pas boire d'alcool, ni s'exposer fortement au soleil la veille et le jour de la séance.

ANESTHÉSIE

La mise en place des fils nécessite le plus souvent une anesthésie locale obtenue par injection d'un produit anesthésiant en différents points cutanés superficiels au début de la séance.

LA SEANCE

En fonction du praticien, du nombre de zones à traiter, de l'ampleur des améliorations à apporter, et de la nécessité éventuelle de réaliser une anesthésie, la séance peut durer de 20 minutes à 1 heure.

En pratique, il existe plusieurs techniques et chaque médecin adoptera une méthode qui lui est propre et qu'il adapte à chaque cas pour obtenir les meilleurs résultats. Un nettoyage soigneux de la pièce et du lit médical aura été effectué avant votre venue. Un drap propre vous accueillera. Un nettoyage suivi d'une désinfection soigneuse seront effectuées, avec des produits selon vos allergies et une procédure réputée efficace. On appliquera sur la zone à traiter un drap stérile qui pourra masquer votre vue, de manière à disposer de l'environnement stérile adéquat. Le médecin utilisera une protection stérile adaptée. L'anesthésie permettra d'introduire les fils sans sensation désagréable excessive. Vous ressentirez probablement une légère tension liée à la progression des fils.

Le nombre et schéma de fils nécessaires est variable en fonction de très nombreux paramètres. Il sera évalué le plus précisément possible au préalable.

Dans certains cas, une retouche peut être nécessaire nécessitant la mise en place d'un fil supplémentaire. Cette intervention sera soumise à des honoraires.

APRÈS LA SEANCE

Les douze premières heures, il vaut mieux rester au calme, se reposer et s'abstenir de tout effort violent. Il est recommandé de boire beaucoup. Il est aussi souhaitable d'éviter autant que possible de mobiliser son visage (pas de mimique, ne pas trop parler ni rire, pas d'efforts de mastication). Pendant quelques jours il sera préférable d'éviter l'alcool, les anti-inflammatoires, le soleil et le sauna.

Les suites immédiates peuvent éventuellement être marquées par l'apparition d'un oedème (gonflement) et d'une rougeur cutanée dont l'importance et la durée sont très variables d'un individu à l'autre, mais qui restent habituellement modérés (n'interdisant pas le retour à une vie socio-professionnelle normale très rapidement) et disparaissent au bout de 5 à 10 jours.

Plus rarement, on peut observer durant cette période, au niveau des points d'injections, une certaine sensibilité de la peau, des démangeaisons, une pâleur cutanée, une hyperpigmentation, ou des hématomes ou ecchymoses ponctuels (bleus).

Il faut noter que les premiers jours, il existe souvent quelques irrégularités temporaires dues à la répartition inhomogène de l'oedème et de la peau, ou un aspect d'hypercorrection (en relief) qui vont progressivement disparaître.

RÉSULTATS

Un délai de quelques semaines est nécessaire pour apprécier le résultat définitif. C'est le temps nécessaire pour que le produit se soit bien intégré, que l'oedème ait disparu et que les tissus aient retrouvé toute leur souplesse.

Le résultat immédiat après traitement n'est donc pas le reflet du résultat final. La mise en place des fils de redensification, n'altèrent pas la mobilité des muscles de la face et ne réduisent donc pas les expressions du visage.

Habituellement, les disgrâces traitées sont très nettement atténuées par la mise en place des fils, mais ne disparaissent pas toujours complètement. En effet, certaines localisations sont particulièrement difficiles à traiter et il existe des rides profondes et anciennes qui ne pourront jamais être complètement effacées.

Le but de ce traitement est d'apporter une amélioration et non pas d'atteindre la perfection. Si vos souhaits sont réalistes, le résultat obtenu devrait vous donner une grande satisfaction.

On a vu que la durée d'action est extrêmement variable selon les zones à traiter, la technique, et les patient(e)s en fonction du type de peau, de l'hygiène de vie (stress, tabac, alcool, soleil...) et du degré de perfection recherché. La correction n'est que temporaire et le traitement devra être renouvelé pour entretenir le résultat.

EFFETS INDESIRABLES POSSIBLES

Tout acte médical si minime soit-il, comporte un certain nombre d'incertitudes et de risques. En choisissant un praticien qualifié, formé spécifiquement à ces techniques, vous limitez ces risques sans toutefois les supprimer complètement, d'autant plus que la majorité des problèmes potentiels sont inhérents au produit lui-même et aux réactions qu'il peut induire de façon imprévisible :

- Résultats esthétiques insuffisants ou inharmonieux. Le risque d'asymétrie des résultats est minime mais non nul, tempéré par la douceur même de cette technique;
- Réactions allergiques : elles sont exceptionnelles ;
- Réactions locales post-injections : oedème, rougeur, pâleur, irrégularités, sensibilité, démangeaisons, ecchymoses, hématomes. Ces réactions ne sont toutefois que temporaires ;
- Poussée d'herpès cutané : chez les sujets prédisposés il faudra envisager une prévention médicamenteuse
- Réaction inflammatoire aigue ou prolongée, hyperpigmentation cutanée, perception du fil sous la peau ;
- Granulomes : Il s'agit de petits nodules indurés, plus ou moins sensibles, perceptibles au toucher, parfois visibles et inesthétiques. Ils correspondent à une réaction inflammatoire localisée pouvant évoluer par poussées. Ils peuvent apparaître quelques jours à quelques semaines après la séance.
- Complications rarissimes : quelques cas ont été décrits de rougeur persistante plusieurs semaines, d'infections ou de nécrose cutanée, localisés sur le trajet des fils. Plus théorique que déjà observée (aucun cas dans la littérature médicale), des lésions neurologiques dans le traitement de certaines régions plus délicates (sourcil) avec un risque théorique de perte de sensibilité qui peut être prolongée.

Au final, il s'agit d'une technique éprouvée et appréciée du fait de ses caractéristiques uniques d'efficacité et sécurité avec une procédure purement médicale mais il est important de comprendre que la technique la moins agressive comporte toujours une part d'aléas qui peut nécessiter évaluation et prise en charge. Le recours à un praticien qualifié vous assure que celui-ci vous offre la compétence optimale requise pour minimiser ou traiter ces risques aussi incompressibles que rares.

"Je soussigné(e)
certifie avoir reçu le
de la part du Dr
une information claire et précise concernant l'intervention prévue le
et avoir toute le temps de réflexion et occasions de poser toute question que j'ai jugé nécessaire pour
prendre une décision éclairée."

A

le.....

Signature